

Diosmolyte®

Diosmektit 3 g + elektrolitok

Alkalmi felhasználásra való por felsőleges

szuszpenzióhoz

12 tasak egyszerhasználatos orvostechnikai eszköz  0426

ÖSSZETÉTEL

Egy tasak por tartalma: 3,00 g diosmektit, 0,263 g nátrium-klorid, 0,0373 g kálium-klorid, 0,162 g vízmentes trikálium-citrát, 0,147 g trinátrium-citrát, 1,982 g glükóz (vízmentes dextróz). Segédanyagok: vanillin, nátrium szacharin, szilícium-dioxid, tejszín aroma, vanília aroma; színezék: béta-karotin.

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A **Diosmolyte®** alkalmi használatra szolgáló por felsőleges szuszpenzióhoz, egyszerhasználatos orvostechnikai eszköz, tasakokba töltve. Felbontás után egy tasak tartalmát csak egyszer szabad használni. A tasak tartalmát 100 ml vízben kell feloldani. A homogén szuszpenzió eléréséhez a port öntse bele egy pohárba, adjon hozzá vizet, és lassan keverje össze. A **Diosmolyte®**-t étkezések között ajánlott bevenni.

JAVALLATOK

Akut (heveny) és krónikus (tartós) hasmenés, valamint emésztőrendszeri betegségekhez kapcsolódó fájdalmas tünetek szájon át történő kezelése.

A **Diosmolyte®** a sugárterápia és kemoterápia okozta hasmenés megelőzésére javallott.

AJÁNLOTT ADAG

Az első három napban:

2 éves kor feletti gyermekek: legfeljebb naponta 4 tasak.

Felnőttek: legfeljebb naponta 6 tasak.

Ezután a kezelést a fenti adagok felével kell folytatni a hasmenés teljes megszűnéséig.

A KEZELÉS IDŐTARTAMA

A **Diosmolyte®**-t nem szabad 5 egymást követő napnál hosszabb ideig használni.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

HOGYAN HAT A DIOSMOLYTE®?

Minden tasak **Diosmolyte®** diosmektitet és elektrolitokat tartalmaz.

A diosmektit egy természetes agyag, jellemzője a nagyon vékony, egymás fölött elhelyezkedő csíkokból álló kristályos szerkezet, amely nagymértékű abszorpció (megkötő) képességet biztosít, lehetővé téve, hogy a diosmektit megkösse a bélcsatornában felgyülemlett folyadékot és ezáltal szilárdabbá tegye a székletet és lelassítsa annak kiürülését. Ily módon a **Diosmolyte®** csökkentheti a hasmenés okozta kiszáradás kockázatát is, továbbá kiegyensúlyozott elektrolit-tartalmának köszönhetően elősegítheti a só- és vízháztartás egyensúlyának normalizálását.

A diosmektit abszorpció (megkötő) képessége azt is lehetővé teszi, hogy a **Diosmolyte®** kölcsönhatásba lépjen a gyomor, illetve nyombél falát borító nyálkahártyában lévő glikoproteinekkal, és módosítsa azok fizikai jellemzőit, ezzel olyan védőgélrt hozva létre, amely megakadályozza a savak és a gyomorkárosító anyagok túlzott mértékű elválasztását.

BIZTONSÁG ÉS AMIRE FIGYELNI KELL AZ ALKALMAZÁS ELŐTT

Kérjen orvosi tanácsot, ha egyidejűleg más kezelést is kap.

A **Diosmolyte®** gyermekektől elzárva tartandó! Ne használja fel a **Diosmolyte®**-t, ha az eredeti csomagolás nem teljesen sértetlen. Ne használja a **Diosmolyte®**-t a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.

FIGYELMEZTETÉSEK

A diosmektit nagy abszorpció (megkötő) képessége csökkentheti bizonyos szájon át szedett gyógyszerek emésztőrendszerből történő felszívódását. Ezért az egyéb, szájon át szedett gyógyszereket jóval a **Diosmolyte®** bevétele előtt vagy után kell bevenni.

A **Diosmolyte**®-t székrekedésben szenvedők nem szedhetik. Azoknak a betegeknek, akik cukorbetegségben szenvednek vagy egy bizonyos diétát kell tartaniuk, figyelembe kell venniük, hogy a **Diosmolyte**® cukrokat tartalmaz. Ha bármilyen gyógyszert szed, a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával.

Ha terhes vagy szoptat, a készítmény szedése előtt beszéljen kezelőorvosával.

Gluténmentes.

2 évesnél idősebb gyermekek esetén is alkalmazható.

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM ÉS TÁROLÁS

A **Diosmolyte**® felhasználhatósági ideje 36 hónap, a csomagoláson feltüntetett lejáratí idő után nem szabad felhasználni. A **Diosmolyte**®-t szobahőmérsékleten kell tárolni, nem szabad közvetlen napfénynek, hőforrásnak, nagy páratartalomnak kitenni és nem érintkezhet vízzel. A lejáratí idő sértetlen csomagolású és megfelelóen tárolt termékre vonatkozik.

GYÁRTÓ

Pharma Line S.r.l.,
Via Bertani 2 - 20154 Milánó,
Olaszország

FORGALMAZÓ

MagnaPharm Hungary Kft.
F99 Irodaház, 1119 Budapest,
Fehérvári út 99., 4. Emelet
Magyarország

A CSOMAGOLÁSON TALÁLHATÓ JELEK MAGYARÁZATA



Egyszerhasználatos orvostechnikai eszköz



Alkalmazás előtt olvassa el a használatí útmutatót!



Tárolja 0 és 40 Celsius-fok között!



Közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tartandó



Túlzott páratartalomtól és vízzel való érintkezéstől védendő



Figyelmeztetés



Gyártó



Gyártási tétel száma



Lejáratí idő



Orvostechnikai eszköz

Dokumentum lezárása: Rev.00 / 2023. 04. 27.